

# Bêtabloquants

## Principales indications chez l'enfant

- Traitement antiarythmique
- Traitement de l'Insuffisance cardiaque
- Traitement de l'HTA (rarement en 1<sup>ère</sup> intention)
- Traitement des Hémangiomes
- Prévention et traitement du malaise anoxique dans la Tétralogie de Fallot
- Traitement préventif dans la maladie de Marfan

Différentes molécules utilisées avec leur posologie et leur indication préférentielle

Produit	Posologie	Indication
acébutolol Sectral® Comprimé PO : 1cp = 200 mg soluté PO 1ml = 40 mg	3 à 12 mg/kg/j en 3 prises posologie progressive	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Trouble du rythme</li> <li>• HTA</li> </ul>
propranolol Avlocardyl® Comprimé PO : 1cp = 40mg	1 à 4 mg/kg/jour en 3 prises posologie progressive	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Trouble du rythme</li> <li>• HTA</li> <li>• Prévention du malaise de la Tétralogie de Fallot</li> <li>• Prévention dilatation aorte dans la maladie de Marfan</li> </ul>
propranolol Avlocardyl® Ampoule IV : 5ml = 5mg	1 mg de propranolol dans 5 ml de glucosé isotonique injection IV lente sous contrôle de la fréquence cardiaque : à interrompre dès que la fréquence cardiaque est <100/mn	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Traitement du malaise de la Tétralogie de Fallot</li> </ul>