



- Visage de l'enfant dégagé et visible en permanence : l'expliquer aux parents.
- Epaulles de la mère et dos de l'enfant recouverts de couvertures et température ambiante 22-24 °C.

### **SURVEILLANCE : FICHE DE SURVEILLANCE DU NOUVEAU-NÉ EN SALLE DE NAISSANCE**

- Comportement de l'enfant (vigilance, tonicité, réactivité), liberté des voies aériennes supérieures, coloration
- Au moins toutes les 15 minutes par le personnel soignant de la salle de naissance
- Rapporter sur la fiche les éléments de la surveillance.
- A renforcer chez les primipares
- Examen clinique et surveillance de la SpO<sub>2</sub> au moindre doute.
- En cas d'impossibilité de contact précoce mère-enfant après la naissance, le peau à peau peut aussi être réalisé avec le père selon les mêmes modalités.

#### **POUR EN SAVOIR PLUS**

- Moore ER, Anderson GC, Bergman N, Dowswell T. Early skin-to-skin contact for mothers and their healthy newborn infants. *Cochrane Database Syst Rev* 2012;5: CD003519.
- Hays S, Feit P, Barré P, Cottin X, Huin N, Fichtner C et al. Respiratory arrest in the delivery room while lying in the prone position on the mothers' chest in 11 full term healthy neonates. *Arch Pediatr* 2006;13:1067-8.
- Erlandsson K, Dsilna A, Fagerberg I, Christensson K. Skin-to-skin care with the father after cesarean birth and its effect on newborn crying and prefeeding behavior. *Birth* 2007;34:105-14.
- Branger B, Savagner C, Roze J-C, Winer N, Pédiatres des maternités des Pays-de-la-Loire. Eleven cases of early neonatal sudden death or near death of full term and healthy neonates in maternity wards. *J Gynecol Obstet Biol Reprod* 2007;36:671-9.