

PRÉVENTION DU RISQUE INFECTIEUX CATHÉTER OMBILICAL

Ces recommandations ont pour but de diminuer la fréquence des infections associées aux cathéters ombilicaux.

GÉNÉRALITÉS

Chez l'enfant de moins de 1 mois, la polyvidone iodée, la chlorhexidine alcoolique et l'alcool éthylique modifié camphré sont contre-indiqués.

Il n'est pas nécessaire de rincer l'antiseptique après son application (si besoin, enlever l'excès à la fin de la procédure avec une compresse stérile) et il convient de bien le laisser sécher avant de poser le cathéter.

PRÉPARATION DE L'ENFANT

- Vérifier la température et différer le geste en cas d'hypothermie
- Protéger l'ombilic des urines chez le garçon

PRÉVENTION DU RISQUE INFECTIEUX

- **Environnement**
 - Limiter le nombre de personnes présentes (professionnels et parents) et les allées et venues lors du geste
 - Travailler sur un plan de travail propre et désinfecté
 - Disposer le matériel nécessaire sur un champ stérile
- **Opérateurs**
 - Opérateur : charlotte, masque chirurgical, [désinfection chirurgicale des mains par friction](#), casaque stérile gants stériles
 - Aide opérateur : charlotte, masque chirurgical, [friction hydro-alcoolique des mains](#)
- **Préparation cutanée**
 - Utiliser systématiquement des compresses stériles
 - Déterger, rincer, sécher, appliquer l'antiseptique par tamponnements en raison de l'extrême fragilité du nouveau-né et du risque d'irritations
 - Limiter l'application d'antiseptique à la seule zone où elle est utile
 - Ne pas laisser les compresses imbibées d'antiseptique en contact avec le cordon (risques toxiques et de brûlures)
- **Respecter les temps de contact préconisés**